

21. Kursusgang: Vektorer i rummet 2

Det næste vi vil studere er, hvordan linjer og planer i rummet kan beskrives (i.e. i tre dimensioner). Vi vil betragte parameterfremstillingen for en linje i rummet, samt planens ligning.

Hvis vi får givet et fast punkt $A = (x_0, y_0, z_0)$ på den linje, vi gerne vil bestemme samt en vektor $\vec{r} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$, som er parallel med vores linje (en sådan vektor kaldes for en retningsvektor), så er parameterfremstillingen givet ved

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

hvor $t \in \mathbb{R}$. Det skal forstås således at vi starter med et punkt (x_0, y_0, z_0) på vores linje og så går vi i retningen af vores retningsvektor (som er parallel med vores linje) og dermed kan vi beskrive samtlige punkter på vores linje, ved at ændre på t , som bestemmer længden vi går.

Eksempler:

1. Lad $A = (2, 2, 2)$ og $\vec{r} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ og bestem parameterfremstillingen for linjen:

Vi indsætter i (1) og får

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

2. Find skæringspunkterne mellem kuglen $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ og linjen beskrevet ved parameterfremstillingen

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Ud fra parameterfremstillingen får vi de tre ligninger

$$x = 2 - t.$$

$$y = 2 - t.$$

$$z = 2 - t.$$

Vi indsætter nu disse i kuglens ligning og får

$$3 = x^2 + y^2 + z^2 = (2 - t)^2 + (2 - t)^2 + (2 - t)^2 = 3(2 - t)^2 = 3t^2 - 12t + 12.$$

Det giver os andengradslingen

$$3t^2 - 12t + 9 = 0,$$

som vi kan løse

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{12 \pm \sqrt{36}}{6} = \frac{12 \pm 6}{6} = \begin{cases} 3 \\ 1 \end{cases}.$$

Ved at indsætte $t = 3$ og $t = 1$ i vores ligninger for x og y får vi de to skæringspunkter $(-1, -1, -1)$ og $(1, 1, 1)$. Dvs. $(x, y, z) = (-1; -1; -1); (1; 1; 1)$

Planens ligning: Hvis vi får givet et fast punkt $A = (x_0, y_0, z_0)$, som ligger på den plan vi gerne vil bestemme, samt en vektor $\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, som står vinkelret på planen (en sådan vektor kaldes for en normalvektor), så har vi for ethvert punkt $B = (x, y, z)$, der ligger på vores plan, at

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{bmatrix} = 0,$$

da de to vektorer er ortogonale. Hvis vi udregner prikproduktet får vi ligningen

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0, \quad (2)$$

som kaldes planens ligning i rummet.

Hvis vi får givet et punkt $A = (x_1, y_1, z_1)$ samt en plan α med ligning

$$ax + by + cz + d = 0,$$

så kan vi bestemme afstanden fra vores punkt til planen ud fra formlen

$$\text{dist}(A, \alpha) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (3)$$

Eksempler:

1. Lad $\vec{n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ og $A = (4, 0, 3)$ og bestem planens ligning:

Vi indsætter i (2) og får

$$0 \cdot (x - 4) + 1 \cdot (y - 0) + 2 \cdot (z - 3) \Leftrightarrow y + 2z - 6 = 0.$$

2. Bestem afstanden fra punktet $A = (0, 1, 0)$ til planen α med ligning

$$2x + 2y + z - 9 = 0 :$$

Vi benytter (3) og får

$$\text{dist}(A, \alpha) = \frac{|2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 9|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|-7|}{\sqrt{9}} = \frac{7}{3}.$$

3. Bestem skæringen mellem de to planer α og β givet ved ligningerne

$$\alpha: x - 3y + z - 1 = 0 \quad \text{og} \quad \beta: 2x - 5y - 2z + 4 = 0.$$

Vi benytter de lige store koefficienters metode ved at tage 2 gange ligningen for α og trække fra ligningen for β og dernæst at tage 2 gange ligningen for α og lægge til ligningen for β . Så får vi de to ligninger

$$y - 4z + 6 = 0 \quad \text{og} \quad 4x - 11y + 2 = 0.$$

Vi ser, at y indgår i begge ligninger, så hvis vi lader $y = t$ og isolerer z i den ene ligning samt x i den anden ligning, så får vi

$$z = \frac{1}{4}t + \frac{3}{2} \quad \text{og} \quad x = \frac{11}{4}t - \frac{1}{2}.$$

Det giver os at parameterfremstillingen for skæringslinjen er

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{2} \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} \frac{11}{4} \\ 1 \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$